

Impfkalender 2015/2016 - Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2015



impfen-info.de

Wissen, was schützt.

Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)

Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)

Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)					Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)				Erwachsene (ab 18 Jahre)		
	6 Wochen	2 Monate	<u>U4</u> 3 Monate	4 Monate	<u>U6</u> 11–14 Monate	<u>U7</u> 15–23 Monate	2–4 Jahre	<u>U9</u> 5–6 Jahre	<u>J1</u> 9–14 Jahre	15–17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus >		G1	G2	G3	G4	N		A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie >		G1	G2	G3	G4	N		A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis) >		G1	G2	G3	G4	N		A1	A2		A ^d	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >		G1	G2	G3	G4	N						
Kinderlähmung (Poliomyelitis) >		G1	G2	G3	G4	N			A		ggf. N	
Hepatitis B >		G1	G2	G3	G4	N						
Pneumokokken >		G1 ^b		G2	G3	N						S ^f
Rotaviren >	G1 ^a	G2	(G3)									
Meningokokken C >					G (ab 12 Monaten)		N					
Masern >					G1	G2	N				S ^e	
Mumps >					3-fach- Impfung MMR	3-fach- Impfung MMR + Windpocken	N					
Röteln >							N					
Windpocken (Varizellen) >					G1	G2	N					
Gebärmutterhalskrebs (HPV) >								♀ G1+G2 ^c	♀ N ^c			
Grippe (Influenza) >												S (jährlich)

Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

U Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Kinder

G Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1 - G4)

S Standardimpfung

♀ Impfeempfehlungen für Mädchen und junge Frauen

J Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

N Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

A Auffrischimpfung

^a die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

^b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

^c je nach Impfstoff 2 Impfungen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren, bei Nachholen der HPV-Impfung ab einem Alter von 13 bzw. 14 Jahren 3 Impfungen

^d einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

^e Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Immunschutz

^f einmalige Impfung ab 60 Jahre, je nach Gesundheitszustand ggf. Auffrischung